



Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit



Institute for Animal Health te Pirbright, (UK) (Pirbright)

Blauwtong

Vaccineer uw dieren voor juni 2009!



Heeft u schapen, geiten, runderen, andere herkauwers of kameelachtigen? Laat uw dieren dan inenten tegen blauwtong type-8. Zo beschermt u uw eigen én andermans dieren. U kunt uw dierenarts vragen uw dieren te vaccineren.

Het is belangrijk dat u uw dieren vaccineert vóór juni, omdat uw dieren vanaf dan het risico lopen om geïnfecteerd te worden met blauwtong. Blauwtong wordt overgebracht door knutten (mugjes) die vooral in de zomer actief zijn. Daarom wordt 1 juni gezien als het begin van het blauwtong seizoen. Vaccinatie is de enige manier om uw dieren te beschermen tegen blauwtong.

Blauwtong is een ernstige ziekte die runderen, schapen, geiten, hertachtigen en in mindere mate ook kameelachtigen treft. Blauwtong veroorzaakt sterfte, vroeggeboorten en verminderde productiviteit bij runderen en schapen. Nakomelingen kunnen geïnfecteerd geboren worden en sterven dan in veel gevallen.



Schapen zijn het meest gevoelig voor de ziekte. Runderen zijn het vaakst geïnfecteerd, maar vertonen niet altijd klinische symptomen. In 2009 is er, anders dan in 2008, geen subsidie voor vaccinatie tegen blauwtong.

Export

Voor export dienen vaccinaties geregistreerd te zijn. Doe dit dus altijd als er een kans is dat u uw dieren voor export verkoopt. Meer informatie over registratie van gevaccineerde dieren kunt u vinden op de website van de Voedsel en Waren Autoriteit www.vwa.nl

Meer informatie over blauwtong kunt u vinden op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit www.minlnv.nl

Neem vandaag nog contact op met uw dierenarts